

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Левояпс Levoyapsum

**Торговое название:** Левояпс

**Действующее вещество (МНН):** Левофлоксацин

**Лекарственная форма:** Капли для глаз.

**Состав:**

Левофлоксацина гемигидрата

25 мг;

**Описание:** прозрачная жидкость от светло-желтого до светло-зеленовато-желтого цвета.

#### **Фармакологические свойства**

##### **Фармакодинамика**

Глазные капли Левояпс - L-изомер рацемического вещества офлоксацин. L-изомер в основном определяет антибактериальную активность офлоксацина.

##### *Механизм действия*

Левофлоксацин подавляет бактериальную топоизомеразу II типа у грамотрицательных бактерий и топоизомеразу IV у грамположительных бактерий.

##### *Механизмы устойчивости*

Устойчивость бактерий к левофлоксацину может развиваться посредством двух основных механизмов – уменьшение внутрибактериальной концентрации лекарства или изменение прицельных для лекарства ферментов.

##### *Антибактериальный спектр*

Категория I: распространенные чувствительные виды.

*Аэробные грамположительные микроорганизмы*

*Аэробные грамотрицательные микроорганизмы*

*Другие микроорганизмы:* Chlamydia trachomatis.

##### **Фармакокинетика**

Левофлоксацин хорошо сохраняется в слезной пленке.

Биоабсорбция высокая - от 60 до 100 %.

#### **Показания к применению**

- ✓ Местное лечение поверхностных бактериальных инфекций глаз:
  - бактериальный конъюнктивит;
  - блефарит;
  - гнойная язва роговицы;
  - гонорейные и хламидийные заболевания глаз;
- ✓ Профилактика осложнений после хирургических и лазерных операций на глазу/глазах.

#### **Способ применения и дозы**

Перед применением встряхнуть флакон! Перед закапыванием контактные линзы необходимо снять, их можно снова надеть через 15 минут после закапывания.

Для всех пациентов - в первые 2 дня закапывают по 1-2 капли раствора через каждые 2 часа, не более 8 раз в день в период бодрствования. С 3-го по 5-й день закапывают по 4 раза в день. Продолжительность лечения - 5 дней.

Для избегания системного всасывания лекарства через слизистую носа и усиления местного действия, носослезный канал прижимают пальцем в течение 2-3 минут после инстилляций.

*Техника закапывания в глаза.* Наклонить голову назад и оттянуть нижнее веко вниз, чтобы получился карман и закапывать в него 1-2 капли препарата. Закрывать глаза и вращать глазными яблоками в течение 1-2 минут.

#### **Побочные действия**

*Аллергические реакции:* экстраокулярные глазные аллергические реакции.

*Со стороны органов зрения:* снижение остроты зрения и появление слизи в виде тяжей;

*Местные реакции:* отёк века, дискомфорт, зуд и боль в глазах,

**Противопоказания**

- повышенная чувствительность к левофлоксацину или к другим хинолонам, а также компонентам препарата, например, к бензалконию хлориду;
- детский возраст до 1 года.

**Лекарственные взаимодействия**

Интервал между применением местных офтальмологических капель не менее 15 минут.

При одновременном применении с мазевыми глазными препаратами сначала применяют капельные формы.

**Особые указания**

Препарат нельзя вводить субконъюнктивально, следует избегать прямой инстиляции в переднюю камеру глаза.

Не следует применять препарат во время ношения гидрофильных (мягких) контактных линз .

***Применение при беременности и лактации***

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности нет.

При необходимости следует временно прекратить грудное вскармливание.

***После вскрытия флакона капли следует использовать в течение 4-х недель.***

***Не замораживать!***

**Форма выпуска**

По 5 мл препарата помещают в пластиковые флаконы белого цвета, укупоренных пробкой-капельницей и завинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия.

**Срок годности** 3 года.

**Условия отпуска** По рецепту.

**Производитель**

«BALKANPHARMA-RAZGRAD AD» 68, Aprilsko Vastanie Blvd 7200

Разград Болгария. Tel: (+359 84) 660 999 [office@antibiotic.bg](mailto:office@antibiotic.bg)

**Произведено для**

«BELINDA LABORATORIES LLP» Лас Сюит, улица 5 Перси, Лондон, В1Т 1ДГ, Великобритания.