

УРОЛЕКТ



«MAQULLANGAN»

Özbekiston Respublikasi Soʻqʻoni saqlash vazirligi huzuridagi
Farmatsevtika tarmogʻini rivojlanishini agentligining
«Dori vostilar, tibbi buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi
va standartlashish davlat markazi» DUK
27.06.2019y. №12

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА

Препаратнинг савдо номи: Уролект

Дори шакли: ичга кабул килиш учун эритма тайёrlаш учун вижидловчи гранулалар

Тарқиён:

Хар бир 4 пакет куйидагиларни саклайди:

фаол моддалар:

бикарбонат натрий ВР	1760 мг
узум кислотаси ВР	890 мг
сувезимон кислотаси ВР	720 мг
сувез натрий цитрати USP	630 мг;

ердамча модда: лимон ароматизатори.

Таъриғи: оқдан дэврия оқ рангичча бўлган лимон таъмли гранулалар

Фармакотерапевтик гурухи: урологик касалликларни даволаш учун

препараллар.

АТХ коди: G04BC

Фармакологик хусусиятлари

Фармакоинамикаси

Натрий бикарбонати кислоталарни нейтрализацияруви чи сийдикда кислота даражасини пасайтируви ишкорловчи агент. Сийдикда юкори кислоталини яллангандан ковуки сийдик билан тўхнавуви натижасида ачишихи хиссени чакириши мумкин. Натрий бикарбонатин асосини вазифаси – дискомфортин ва сийдик чикарилиши оғрикли ингилаштириш.

Узум кислотаси кислота компоненти сифатида қўлланади, унда бикарбонатни нейтрализацииради.

Лимон кислотаси препаратни янада тезорок сўрилишига ёрдам беради. Сўрилган алкалозни ривожланнишга олиб келади. Сийдикни ишкорланниш сийдик чикариши йўлларида сийдик кислоталарни чукмага тушишини олдин олади.

Сувез натрий цитрати – антикоагулянт восита, конни ивучанинги пасайтиради, конни ишкорий заҳираларини оширади, сийдикни ишкорлашиди. Ca²⁺ (плазмадаги IV кон ишви омили) боғланади ва гемокоагуляция имкон бермайди. Организмда Na⁺ концентрациясини оширади. Сийдик реакциясини кислоталидан ишкорий томонга ўтариниша дизурхололатларни йўқ бўлиншига олиб келади.

Фармакокинетикаси

Ичга кабул килингандан кейин натрий бикарбонат мельда кислотасини нейтрализацииради. Плазмада, сийдикда бикарбонат танкислиги бўлумдан бикарбонат реакциядан катнашмайди, у сўрилди, натижада у ишкорланади. Сўрилгандан кейин натрий цитрати натрий хосил килиб бикарбонат метаболизига учрайди. Цитратни оксидланниш тўлиқ ва камиди 5% у ўзгармаган кўринишда сийдик билан чикарилиди. Лимон кислотаси ис гази ва сувчага метаболизмага учрайди ва факат вактинчалик самарага ега. Вактинча компонент сифатида фаолият кўрсатади. Узум кислотаси кислота компоненти сифатида бикарбонатни нейтрализацииради.

Қўлланниш

–сийдикни ишкорлашуви;

–дизурияни симптоматик даволаш (бактериал инфекцияларни хеч кандай клиник алломатларни бўлмаган циститда, сийдик-чикариш йўлларининг енгил инфекцияларида дискомфорти камайтириш учун);

–сийдик кислотаси ва кальций-оксалат тошларини эритиш ва уларни хосил бўлишини отхолантариш учун;

–метаболик ацидоз;

–сийдик-чикариши йўлларининг инфекцияларida кўшимча даволаш сифатида: симптомларни ингилаштириш ва антибиотиклар таъсирини кучайтириш учун қўлланилиди.

Қўлланниш услуби ва дозалари

Препаратни қўллашдай олдин пакет ичдагини сувда эритиш керак, шунингдек кўшимча тайёр эритмани сув билан ичиш мумкин.

Камталаш: 1-2 пакетчани (4-8 г) стаканинга тўртдан уч кисмини сувда эритиб, кунингга 2-3 марта 5 кун давомидан қўлланилиди.

Болалар: 6 ёйдан 12 ёнгача: бир пакетчани (4 г) ярим стакан сувда эритиб, кунингга 2-3 марта қўлланади.

Кекиришдан сакланниш учун, препаратни тўлиқ эрганидан сўнг кабул килин.

Ножӯя таъсирлари

Иштагани пасайиши, кўнгил айниши, кусиши, коринда оғрик, артериал босимини ошиши.

Қўлланниш мумкин бўлмаган холатлар

–препарат таркиби гезувчанлик;

–оғир бўйрак етимшомвиллиги ва у билан бояглик бўлган олигурия, азотимия ёки анурияни пациентларда;

–Аддисон касаллиги;

–ўтқир сувесизланнишда;

–иссанлик тиришиниларида;

–миокардни шикастланнишида;

–метаболик алкалоз;

–натрий тузи чекланган пациентларда қўллаш мумкин эмас.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Бир вақтда қўлланганда натрий гидрокарбонати таъсири сийдик pH ошиши натижасида амфетаминни сийдик билан чикарилиши камаади.

Натрий гидрокарбонатини литий карбонатни тавсия этилган ўрнатилган тутуб турувчи дозада қўллаш фониди кон плазмасида литийни концентрациясини камайтиши мумкин, ба натрий ионларни таъсири билан бояглик бўлиши мумкин.

Метотрексат билан бир вақтда қўлланганда метотрексатни сийдик билан чикарилиши кучайди ва натрий гидрокарбонати таъсири остида сийдик pH ошиши натижасида унинг бўйракларга токсик таъсири камаади. Ичга бир вақтда кабул килинганда тетрациклиниларни сўрилиши камаади.

Натрий гидрокарбонати остида сийдик pH ошиши натижасида, эфедринни организмдан чикарилиши кечиниши кузатилиди ва ножӯя самараларини (тремор, хавотирлик, уйқуни бузилиши, тахикардия) ривожланниш хавфи ошиди.

Махсус кўрсатмалар

Агар препаратни кабул килгандан кейин хам симптомлари 2 кундан сонар сакланса, шифокорга мурожаат этинг.

Сийдикни ишкорлананди эхтимоли ва фосфат тошларни хосил бўлиши хавфини ошиши туфайли тизимили кабул килиш тавсия этилмайди.

Киска муддат кабул килинганда КАХ ишкорий томонги салжиги даражада эмонлайтириши мумкин. Кўпинчча мельда яра касаллини (С1 йўкотни) билан биргаликда, кечадиган кусиши якъюл алкалозни якъоллигини кучайтириш хусусиятинга ега. СО2 интенсиви чикарилиши МИЙ деворини тешинишни келтириб чикариши мумкин. Ёндош юрак ёки бўйрак касалликлари бўлган беморларда Na⁺ хаддан ташари кўп истемол мильда яра касаллини чакариради. Ацидозни мувофиқлаштириш учун қўлланилганда КАХ назорат килиши зарур.

Хомиладорликка лактация даврида қўлланниш

Препаратни хомиладорликга таъсири хакида тадқиқотлар ўтказилмаган.

Лактация даврида эхтиёткорликга риоя килиши керак.

Автомобилда «ва мураккаб механизмларни бошқарни кобилиятига таъсири

Тасниф кимлаби.

Дозани ошириб юборилиши

Уролект препаратини дозасини ошириб юборилиши холатларни хакида хабар килинмаган.

Чикарилиши шакли

10 пакетдан, тиббийтда қўлланилишига доир йўрикномаси билан бирга картон ўрмаладарда.

Сакланнишаронти

Қўркук, бўрилгичан химояланган жойда, 25°C дан юкори бўлмаган хароратда саклансан.

Болалар ололмайдиган жойда саклансан.

Яропчилик муддати

2 йил.

Яропчилик муддати ўттач қўлланилмасин.

Дорихоналардан берни тартиби

Рецептсиз.

Савдо маркаси ва рўйхатдан ўтганлик гувохномаси эгаси

VEGAPHARM LLP

Сунт, 1, 5 Переи-стрит, Лондон,

W1T 1DG, Буюк Британия

Ишлаб чикарувчи/Manufactured by:

Ind-swift limited

Off. N-101, Village Jawaharpur, Tehsil-Derabassi,

District S.A.S Nagar (Mohali), Punjab, Хиндистон

Ўзбекистон Республикаси худудида дори воситасининг сифати бўйича шикоятлар (таклифлар) ни кабул килувчи ташкилот номи маънини

“Ameliya Pharm Service” МЧЖ

Ўзбекистон, 100015, Тошкент ш., Ойбек кўч., 36, бизнес маркази “EAST LINE”

Тел.: +998 78 150 50 81, +99878 150 50 82.

e-mail:uzdrugsafety@evolet.co.uk