ВИПЛАКТИН + АМИНО

ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА
ОЗУҚАГА БИОЛОГИК ФАОЛ ҚЎШИМЧА

1 флакондаги таркиби:
фаол моддалар:
дозатор-қопқочасида:
Bifidobacterium animalios ssp. lactis &
Bifidobacterium breve .... $2*10^9$ КОЕ
Lactobacillus rhamnosus .... $1*10^9$ КОЕ
L-аланин .... 50 мг
L-глутамин .... 50 мг
B_2 витамини .... 0,7 мг
B_6 витамини .... 0,7 мг
D витамини .... 2,5 мкг
B_{12} витамини .... 1,25 мкг
10 мл флаконда:
Фруктоолигосахаридлар .... 1,0 г
L-аргинин .... 50 мг
Наъматак .... 48 мг
Жумладан С витамини .... 24 мг
Цинк .... 1,5 мг
ёрдамчи моддалар:
дозатор-қопқочасида: микрокристалл целлюлоза, магний стеарати, кремний диоксиди.
10 мл флаконда: фруктоза, сув.

Фаол ингредиентларнинг хусусиятлари
Bifidobacterium animalis юқори колонизация салоҳиятига эга, бифидобактериялар сонини ошириш учун қулай шароитларни таъминлайди.
Bifidobacterium breve уксус ва сут кислотасини ҳосил қилиб углеводларни фаол ферментлайди, витаминлар ва полисахаридларни синтезлайди, иммунитетни рағбатлантиради, патоген ва шартли-патоген микрофлорани ривожланишини бостиради, овқат ҳазм қилиш функциясини яхшилашга ёрдам беради.
Lactobacillus rhamnosus фойдали ичак микрофлорасини табиий мувозанатини тиклашга қодир.
Фруктоолигосахаридлар пребиотик сифатида ичакда фойдали лакто- ва бифидобактерияларни кўпайишига ёрдам беради. Пребиотиклар билан мажмуада пробиотиклар ичак микрофлораси мувозанатини қўллаб туради.
Наъматак меъда ва меъда-ичакнинг меъёрий фаолияти учун фойдали, қўллаб турувчи ва умумий мустаҳкамловчи таъсирга эга, алмашинув жараёнларини фаоллаштиради.
Цинк ва *D*, B_2, B_6, B_{12} витаминлар билан мажмуада иммун тизими фаолиятини фаоллаштиради, организмга қувват берувчи таъсир кўрсатади.

Қўллаш соҳаси
Ичакнинг соғлом микрофлорасини самарали қўллаб туриш, меъёрда ҳазм қилиш жараёнини таъминлаш ва дисбактериоз ривожланишини олдини олиш учун овқатга БФҚ сифатида қўлланилади.

Қўллаш усули
Катталар ва 3 ёшдан болаларга кунига 10 мл дан қабул қилиш тавсия этилади.
Флаконни қўллаш бўйича тавсиялар









1. Калитни маҳсулотнинг қопқоғига ўрнатинг.
2. Таркиби бутилкага тушиши учун қопқоқни соат стрелкаси бўйлаб тўхтагунча буранг.
3. Бутилкани чайқатинг.
4. Қопқоқни очинг ва таркибни ичинг.

10 мл даги озуқавий қиймати (г):
Оқсиллар 0 г
Ёғлар 0 г
Углеводлар 7 г
Энергетик қиймати 3210 кДж / 50 ккал

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар
- БФҚ нинг ҳар қандай компонентларидан бирига юқори сезувчанлик.
- 3 ёшгача бўлган болалар ёши

Махсус кўрсатмалар
Тавсия этилган суткалик дозани ошириш ва БФҚ ни турли мувозанатланган озиқланиш ўрнига қўллаш мумкин эмас.
Қўллашдан олдин шифокор билан маслаҳатлашиш тавсия этилади.
Қўллашдан олдин яхшилаб чайқатилсин.

Чиқарилиш шакли ва қадоқ
10 мл дан 10 та флакон давлат ва рус тилларидаги йўриқномаси билан картон қутида.

Сақлаш шароити
25°С дан юқори бўлмаган қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда сақлансин.
Болалар ололмайдиган жойда сақлансин!

Яроқлилик муддати
24 ой.
Қадоқда кўрсатилган яроқлилик муддати ўтгандан сўнг қўлланилмасин.

Бериш тартиби рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи:
O.F.I. Officina Farmaceutica Italiana S.p.A.,
Бергамо, Италия

Сертификат эгаси:
«Belinda Laboratories» LLP.,
Лондон, Буюк Британия

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида истеъмолчилардан шикоятларни қабул қилувчи ваколатланган ташкилот:
«Ameliya Pharm Service» МЧЖ
Ойбек кўч., 36, «East Line» БМ,
100015, Тошкент ш., Ўзбекистон.
тел: +99878 1505081 +99878 1505082,
e-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk:

Belinda