

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Торговое название препарата: Виплактин С
Действующее вещество (МНН): бациллус клаузи
Лекарственная форма: жидкая суспензия для приема внутрь

Состав:

Каждые 5 мл суспензии содержат:
активное вещество: бациллус клаузи (*Bacillus clausii*) UBVC-07 2 млрд спор;
вспомогательное вещество: очищенная вода.

Описание: жидкая суспензия с небольшой мутностью без запаха в мини флаконах ПЭ.

Фармакотерапевтическая группа: Средство регулирующее равновесие кишечной микрофлоры (пробиотик), МИБП-зубиотик.

Код АТХ: A07FA

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Препарат биологического происхождения. Состоит из спор микроорганизма *Bacillus clausii*, который в норме присутствует в кишечнике, лишённого патогенного действия.

Применение препарата способствует восстановлению микробной флоры кишечника, претерпевшей изменения в процессе нарушений микробной флоры различной этиологии, благодаря деятельности *Bacillus clausii*. Более того, поскольку *Bacillus clausii* способен вырабатывать различные витамины, в частности витамины группы В, этот препарат способствует нормализации нарушений витаминного баланса в организме, вызванного антибиотиками и химиотерапевтическими препаратами вообще. Препарат позволяет добиться неспецифического антигенного и анитоксического эффекта, тесно связанного с метаболической активностью *Bacillus clausii*.

Кроме того, высокая гетерогенная устойчивость к антибиотикам, вызванная искусственно, обуславливает создание лечебного базиса для предупреждения изменения кишечной микробной флоры вслед за селективным воздействием антибиотиков, особенно, антибиотиков широкого спектра действия, или же для восстановления ее равновесия. Также, все штаммы *Bacillus clausii*, входящие в состав препарата Виплактин С обладают способностью продуцировать субстанции, обладающие антимикробными свойствами в отношении некоторых грамположительных бактерий: *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium* и *Clostridium difficile*, а также рота- и аденовирусов.

Фармакокинетика

Благодаря своей высокой устойчивости к химическим и физическим агентам, при пероральном приёме споры *Bacillus clausii* проникают через кислотный барьер желудочного сока в неповреждённом виде и достигают кишечного тракта, где они превращаются в метаболически активные вегетативные клетки.

Показания к применению

– лечение по восстановлению кишечной микробной флоры, вызванные кишечными инфекциями, интоксикациями, нарушением питания, несбалансированным питанием и применением антибиотиков или химиотерапевтических средств;

– острые и хронические желудочно-кишечные расстройства у детей с младшего возраста и взрослых, характерные для интоксикации или нарушений микробной флоры кишечника и вздутие живота.

Способ применения и дозы

Детям в возрасте от 1 месяца до 2 лет: по 1-2 мини бутылочке (5-10 мл) в день.

Детям от 2 до 12 лет: по 1-2 мини бутылочке (5-10 мл) в день.

Детям старше 12 лет и взрослым: 2-3 мини бутылочки (10-15 мл) в день.

Препарат назначают с соблюдением регулярных интервалов (3-4 часа). Продолжительность лечения определяется индивидуально врачом и составляет от 6 до 14 дней.

Содержимое мини бутылочек принимают без разведения или разводя в воде, молоке, чае, апельсиновом соке. Перед использованием содержимое препарата необходимо встряхнуть.

Побочные действия

Аллергические реакции: сыпь и крапивница.

Противопоказания

– повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Лекарственные взаимодействия

Нет данных.

Особые указания

Препарат не взаимодействует с такими антибиотиками, как бензилпенициллин, цефалоспорины, тетрациклины, макролиды, аминогликозиды, новобиоцин, хлорамфеникол, тиамфеникол, линкомицин, изониазид, циклосерин, рифамицин, налидиксовая и пипемидовая кислота.

Если препарат назначают одновременно с антибиотиками, его следует применять между двумя приемами антибиотика.

В мини бутылочках с препаратом Виплактин С возможно наличие видимых частиц, образующихся в результате агрегации спор *Bacillus clausii* и, это соответственно, не свидетельствует о том, что препарат претерпел каких-либо изменений.

Применение при беременности и период лактации

Препарат не противопоказан во время беременности и в период лактации.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Не влияет на способность управлять автомобилем и выполнять работы, которые требуют повышенного внимания.

Передозировка

Передозировка препарата не выявлена.

Форма выпуска

По 5 мл жидкой суспензии для приема внутрь в мини бутылочках.

10 мини бутылочек вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках в картонной упаковке.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.



Владелец торговой марки и регистрационного удостоверения
BELINDA LABORATORIES PVT. LTD., Индия.

Производитель

Unique Biotech Limited, Индия.

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан
ООО «Ameliya Pharm Service»
Узбекистан, г. Ташкент, 100015, ул. Ойбек, 36, БЦ «EAST LINE».

E-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk

Тел.: +998 78 150 50 81, +99878 150 50 82.