

ҚҰЛЛАШ БҮЙИЧА ЙҰРИҚНОМА

«MA'QULLANGAN»

Ozbekiston Respublikasi Sog'ligi Saqlash Vazirligi
Dori vositalari va libby texnika sifatini
nazorat qilish Biroi boshqarmasi
31.05.2017 y. № 10

Препаратнинг савдо номи: Новосалик
Таъсир этувчи маддалар (ХПН): бетаметазон, салицил кислотаси

Дори шакли: сиртга құллаш учун суртма

Таркиби:

Суртманинг ҳар бир грамми қуйидагиларни сақлады:
файл маддалар:

бетаметазон дигропионит, бетаметазонга эквивалент

- 0,5 мг, салицил кислотаси - 30 мг;

әрдамчи маддалар: оқ юмшок парафин, суюқ парафин, изопропилмистрист, оқ асали муми.

Таърифи: оқ рангынан суртма.

Фармакотерапевтик ғуруғы: маҳаллий құллаш учун

глюкоокортикоидтер + кератолитик восита.

АТХ коди: D07XC01.

Фармакологик хусусиятлари

Таъсири таркибига киругчи компонентларга болғыл бүлгін мажмавий препараттардың ялгылланыша қарши, шишақтар, аллергия қарши, вазооконстриктор, антипролифератив, иммунодепрессив, кератолитик, микробларға қарши, замбургуларға қарши да маҳаллий гипотермик таъсир күрсатады. Ялгылланыш медиаторларини ажырлаб чикишини тормозлады, нейтрофилларни четки түтлапшынин олдини олады, ялгылланыш экспудатини ва цитокинлар ишлаб чиқарылышини камайтиради, инфильтрация ва грануляция жарайынларни камайшига оліп көліп, макрофаглар миграциясини камайтиради. Салицил кислотасин мавжудлары туфайлы терини юмататади, мұғыз қаватланышын бартараф этиди ва ГКС چукуркө киришиңа әрдам беради. Суртма сув қайтарувчи тасыраға уңарып таъсир ташынан қамылданған қылупчы химия плёнка хосил қыллады; чүкүр әттінде тасыраға зә бүлип куруқ вә мұрт теріга зә беморларни даволаш учен яроқты.

Құлланыши

- посираз, экзема (айниңса сурункали), ихтиоз, кучпи лихенизация билан кечуучи чегараланған қычима, атопик дерматит, диффуз нейродермит;
- оддий ва аллергик дерматиттар;
- әшәкем, күп шакли экспудатив эритема;
- оддий сурункали темираты (чегараланған нейродермит);
- бошқа ГКС билан даволаша берилмайдын дерматозлар (айниңса қызил мүйловымын темираты), күзиз ясса темираты, тери дисгидрозида құлланади.

Құллаш усулы да дозалари

Фақат сиртга құллаш учун буюрулади.

Сиртга құллаш учун суртма күрініншілдеги Новосалик препаратары фақат сиплини; теріда құллаш учун мұлжалланған. Новосалик суртмаси күннің иккі марта күлланади.

Суртманинг міздори бироз ишкәндей тери іюзасы бүйілаб берік текис қызынанда. Енгіл қолтапларда бир марта құллаш етаптары бўлади.

Узлуксиз даволаш курси давомийлигде одатда 3-4 хафта билан чегараланды. Давомирик даволаш курси зарурати бўлганида препаратарни камрок, масалан күнора құллаш тасвия этилади. Сурункали қасаллапарни даволаганда қасаллап қайталанишидан сақланышын учун даволашни барча симптомлар бартараф этилгандан кеинін айрим вакт шифокор наразоти остида давом этириши керак. Бир йил давомида даволашни бир неча марта тақрорлаш мүмкін.

Нојұя таъсирлари

Нојұя күрініншар өдатда күчсиз характеристика зә.

Үт аюори сезүвчанник реакциясы (чикиши, анишиш әки қизарыш) ривожланыш мүмкін. Кам ҳолларда бошка глюкоокортикоидларни күллагандаги каби акнесимон ўзғарыштар, гипопигментация, стриялар, тері атрофиясы, гипертрохиоз, телевангиэктазиялар, терининг иккиламчи инфекциялары ривожланыш мүмкін.

Зә оңтүстүк сезүвчанник реакциялары әки нојұя күрініншар пайдо бўлган ҳолларда даволашни бекор қилиш ва шифокорга мурожаат этиш керак.

Құллаш мүмкін бўлмаган ҳолатлар

Бетаметазон, салицил кислотаси әки препаратнинг ҳар кандай әрдамчи компонентига үт аюори сезүвчанник. Тери туберкулези, сифилиснинг тери күрініншари, сувчек, терининг вируслин инфекциялары, тери поствакциналан реақциялар, үткір жархолаттар, трофик яралар, розацеа, вульгар хуснбузар, бойликкана бўлган болаларда құллаша мүмкін зәс.

Дориларнинг ўзаро таъсирі

Бошка дори воситалари билан клиник ишончли ўзаро

таъсирлари аниқланмаган. Акнени даволаш учун косметологик ва дерматологик воситаларни, этанол сақловчи воситаларни әки яқол күритеувич самараға зә тибий совунпарни бир вақтда құллаш айрим ҳолларда терини таъсирланишини чақириши мүмкін.

Махсус күрсатмалар

Новосалик суртма тери ва/ёки бошнинг сочли қисмидә фақат сиртга құллаш учун мұлжалланған. Күзлар шишилк қаватларга тушишидан сақланыш керак. Розацеа, периорал дерматит, тери атрофияси ва акне типидә дерматит ривожланышы мүмкунлік туфайли, суртмани зә терисига узоқ вакт суртши тасвия этилмайди. Препараттн ангенитал соҳада құллашадан сақланыш керак. Препаратни зарур бўлган ҳоллардан ташшары окклизион боғлов остида күп тасвия этилмайди. Терида замбургулғи әки бактериал микрофлора ривожланган ҳолларда антибактериал әки замбургуларга қарши воситани кўшимча кўллаш зарур.

Хомиладорлар өз имзиси даери

Хомиладорларда Новосалик препаратини она учун кутилаётган фойда хомила учун хавфдан юқори бўлган ҳоллардагина мажаллий құллаша йўл кўйлади. Бундай ҳолларда препараттн құллаш қиска муддатли ва тери копламаларининг катта бўлмаган соҳадори билан чекланиши керак.

Эмизиш даврида Новосалик препаратини она учун кутилаётган фойда хомила учун хавфдан юқори бўлган ҳоллардагина мажаллий құллаша йўл кўйлади. Бундай ҳолларда препараттн құллаш қиска муддатли ва тери копламаларининг катта бўлмаган соҳадори билан чекланиши керак.

Педиатрияда құлланниши

Болаларда Новосалик препаратини (сиртга құллаш учун суртма) құллаш эттіёткорликиннинг катъий чорапларига риоя килган холда иложи борича киска муддатли булиши керак, чунки болаларда тери қолламаси юзасини тана вазнинг нисбатан кattaатига ва эпидемисни этилиши тўйн эмаслиги туфайли фаол компонентларнинг пропорционал катта микдорини тизимли сўрилиши хаеби мавжуд. Болаларда боғлов остида ва айниқса пластик таглилар остида құллаш мүмкін зәс, нохуши кўрнишлар ривожланниши хавфни ошириши мүмкін.

Транспорт воситалари ва механизмларни бошқариши

Новосалик препаратини транспорт воситалари ва механизмларни бошқариш кобилиятига салбай таъсири хайдида маълумотлар йўк.

Препарат болалар ополмайдиган жойда сақлансан ве яроқлилик муддати ўтгач ишлатилмасин.

Дозани ошириб юборилиши

Бетаметазон ва салицил кислотасини узоқ вакт узлуксиз, айниқса болаларда, терининг катта соҳадаридан, бутунлигини бузилиши бўлган теридада әки окклизион боғлов остида қўллашадан кўп тасвия этилмайди. Бундай ҳолларда препараттн бекор кишиш ва симптоматик даволаш тасвия этилади.

Чиқарылыш шакли

Сиртга құллаш учун суртма 30 г дан тубаларда. Бир туба құллаш бўйича йўриқномаси билан картон кутида.

Сақлаш шароити

Кўркуй, ёргуликдан химолланган жойда, 25°C дан юқори бўлмаган ҳораттада сақлансан.

Музлатилмасин.

Яроқлилик муддати

3 йил.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептциси.

Савдо номи ва рўйхатдан ўтказилганлик

Гувохномасининг эгаси

VEGAPHARM LLP.

Лондон, Буюк Британия

Ишлаб чиқарилган

РЕПЛЕК ФАРМ Ltd. Скопье

Скопье, Македония Республикаси

Ўзбекистон Республикаси худудида дори

воситаларининг сифати бўйича эътироозлар (таклифлар)

ни қабул қиливчи ташкилот номи ва манзили

«Amelya Pharm service» МЧК

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Ц-6, Юнусобод тумани, 92/2.

Тел.: (+998) 71 2356501