

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Торговое название:
Айлинда

Действующее вещество (МНН):
Гипромеллоза

Форма выпуска: капли глазные

Состав

10 мл содержат:
активное вещество:
Гипромеллоза (100%) – 30 мг
вспомогательные вещества:
натрия хлорид, калия хлорид, борная кислота, перборат натрия гидратированный, диэтилен триамин пента (метилен фосфоновая кислота) (ДТГПМФК), хлороводородная кислота, вода для инъекций

Описание

Стерильная, бесцветная или бледно-желтая жидкость, слегка гипотонический водный раствор, содержащий 0,3% гипромеллозы.

Показания к применению

Айлинда применяется при возникновении чувства сухости, усталости или дискомфорта в глазах из-за экологических раздражителей или в ходе хирургических офтальмологических вмешательств. Гипромеллоза является вискозоэластичным соединением. Применяется в качестве протектора эпителия роговицы, оказывает смазывающее, смягчающее действие при пониженной секреции слезной жидкости. Айлинда может использоваться в сочетании со всеми типами контактных линз.

Способ применения

Наклоните голову назад и осторожно потяните нижнее веко от глаза. Закапывайте 1-2 капли раствора в конъюнктивальный мешок каждого глаза и несколько раз поморгайте. Не следует прикасаться кончиком пробки-капельницы к глазам.

Айлинда может применяться так часто, как необходимо в течение дня.

Противопоказания

Не применяйте если у вас повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Особые указания

- Перед тем, как использовать, убедитесь, что кольцо для предотвращения вскрытия флакона не повреждено. В случае повреждения - не используйте.
- Не использовать содержимое глазных капель через 28 дней после первого вскрытия флакона.
- Не использовать по истечении срока годности.
- Если назначено несколько видов различных глазных капель одновременно, то интервал между закапыванием должен быть не менее 5 мин. Айлинда следует применять последним.
- После использования закрывайте флакон.
- Хранить в оригинальной упаковке.
- Избегайте контакта флакона с глазом или окружающими структурами, чтобы предотвратить микробное загрязнение препарата.
- Не используйте флаконы для предотвращения перекрестного заражения.

Предупреждение

Если вы испытываете симптомы дискомфорта или раздражения глаз, прекратите использование продукта и обратитесь к специалисту офтальмологу.

Побочные действия

Может отмечаться затуманивание зрения сразу после инстилляций. Были редкие сообщения о жжении в глазу, аллергическая реакция и покраснения глаз после инстилляций. Если заметили какие-либо симптомы, прекратите использовать и обратитесь к специалисту офтальмологу.

Форма выпуска и упаковка

По 10 мл в белом пластиковом флаконе, оснащенный аппликатором для капельницы, закрытый защитной крышкой с фиксирующим кольцом. По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на русском и узбекском языках помещают в пачку из картона. Утилизируется как обычные бытовые отходы.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 С.
Не замораживать!
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.
Период применения после первого вскрытия флакона – 28 дней при температуре не выше 25 С.
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

«Balkanpharma - Razgrad AD», Разград, Болгария

Владелец торговой марки и регистрационного удостоверения

«Belinda Laboratories» LLP, Великобритания.

Адрес организации, принимающей комментарии от потребителей по качеству продукции на территории

Республики Узбекистан:
ООО «Ameliya Pharm Service»,
ул. Ойбек, 36, 100015, г. Ташкент, Узбекистан
Тел: +998 71 150 50 81, +99871 150 50 82
e-mail: ameliyapharm@gmail.com