

ВЕЛОДЕП

«МА'QULLANGAN»

O'zbekiston Respublikasi Sog'liq sajxash vazirligi huzuridagi
Farmatsivika tarmoqining ijrovalarish agentligini
«Dori vostalar, tibbi buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi
va standartlashtirish davlat markazi» DUK
27.10.2022y. №21

ТИБИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА

Препаратнинг савдо номи: Велодеп

Дори шакли: инфузия учун эртима

Таркиби:

Хар 100 мл эртима куйидагиларин саклайди:

фоал маддадар:

| | |
|---------------------|--------|
| Сорбітол USP | 6,00 г |
| Натрій лактати USP | 1,9 г |
| Натрій хлориди USP | 0,6 г |
| Кальций хлориди USP | 0,01 г |
| Калий хлориди USP | 0,03 г |
| Магний хлориди USP | 0,02 г |

ердамчи маддадар: натрій гидроксиди, натрій метабисульфити, инъекция учун сув.

Таърифи: тиник, рангиз сизи деярли рангиз эртима.

Фармакотерапевтик тургуни: плазма ўрнини босувчи восита.

АТХ коди: B05XA31

Фармакологик хусусиятлари

Фармакодинамикаси

Плазма ўрнини босувчи препарат. Реологик шокка карши, дезинтоксикацион, ишкорлик тасири күрсатади. Асосий фармакологик фоал маддадар сорбіт болати на натрій лактати хисобланади. Жигарда сорбіт олдин фруктозага айланади, у сунгара глюкозага, сўнгра эса гликогенга айланади. Сорбітлонинг изотоник эртимаси деагрегант таъсирга эга ва, шундай килиб, микроциркуляцияни ва тўқималарнинг перфузиини яхшилаиди.

Бинкарбон эртимасидан фаркли равишда, натрій лактати ёрдамида метаболик ацидоз корекция, РН ни кўрсаттичларидаги кескин тебризларни чакирмасдан, уни маддадар амалашварини сакни кириши билан юз беради. Натрій лактатнинг тасири юборилгандан кейин 20-30 минут ўттач номоён бўлади.

Натрій хлориди – плазма ўрнини босувчи восита, дезинтоксикацион ва регидратацион таъсири кўрсатади. Турии патологиян холатларда натрій ва хлор ионларининг танкисигини бартараф килиди.

Кальций хлориди кальций ионларининг танкисигини бартараф килиди. Кальций ионлари неро импульсларининг ўтказилиши жаёренларини, скелет ва силинг мушакларнинг кискаршини, миокард, фолиянтини, сук тўқимасининг шакилларини, коннинг ивишини амалга ошириш учун зарур. Хужайалар ва кон-томирлар деворининг ўтказувчанинни пасайтиради, яллигланиши реакцияни ривожланшини олдин олади, организмининг инфекцияларга чидамалигини оширади ва фаготоксизи ахамиятни кучайтириши мумкин.

Калий хлориди сув-электролит болалинин тиклайди. Манфий хрон- ва батмоторп таъсири, юкори дозаларда – манфий ино-, дромоторп ва ўргача днуретик таъсири чиқаради. Нерв импульсларининг ўтказилишида иштирок килиди. Ацетилхолинлинг мидиронни оширади ва вегетатив нерв тизимишининг симпатик бўлиммининг кўзғалишини чакиради. Мушак дистрофияси, миастенияди скелет мушакларнинг кискариши жаёренларини яхшилаиди.

Фармакокинетики

Сорбіт кон узмий метаболизмга киришиб кетади, унинг 80-90% жигарда утилизация килинади ва гликоген кўрнинишида тўпландади. 5% минг тўқималарди, юрак мушагиди ва скелет мушакларида тўпландади. 6-12% синтик билдан чиқарилади.

Натрій лактат кон-томир хавzasига юборилганда натрій бикарбонати хосил килиб, карбон иккиси олиб келади. Юборилган натрій лактатнинг фракт ярми фоал хисобланади (L изомер), бошка ярми эса (D изомер) метаболизмга утрамайди ва сийдие билан чиқарилади.

Натрій хлориди айданаётган кон кажмини (АКХ) фактак вактинчалик ошириб, кон-томир хавzasидан тез чиқарилади. Диурезни оширади.

Қўлланилиши

- ўтқи кон ўйқотиш, кўйиш касаллигига, травматик, операцияндан кейинги, гемолитик, токсик ва кўйиш шокини олдини олиш ва даволаш мақсадиди капилар кон оқимини яхшилаш учун;

- интоксикация, сурункали гепатитни зўйинши билан бирга кечувчи инфекцион касалликлар;

- сепсис;

- операция олдидан тайёрлаш учун ва операцияндан кейинги даврда;

- тромбоцит, тромбофебиглар, эндартеритларни олдини олиш ва даволаш мақсадиди артериал ва веноз кон иянинини яхшилаш учун;

- Рейно касаллигига кўлланади.

Қўллануусу ва дозалари

Вена ичига онким билан ёки томчилаб юборилади.

Катталарга менингда ичига тезлигида юборилади. Зарурат бўлганда мингига 30 томчи тезлигда томчилаб юборишга йўли билан синама ўтказилгандан кейин, препаратни оқим билан юборишга йўз кўйлади.

15 томчи юборилганидан кейин препаратнинг инфузияси тўхтатилади, 3 минут ўттач эса, реакция кузатилмаганди, Велодеп оқим билан юборилади.

Сурункали гепатитларда – 400 мл дан (тана вазнига 6-7 мл/кг) томчилаб, тақорий юборилади.

Кон томирларни тромбооблитерацияланувчи касалликларда – тана

Кон томирларни тромбооблитерацияланувчи касалликларда – тана

вазнига 8-10 мл/кг хисобидан, томчилаб, тақорий, кун ора юборилади, даволаш курси 10 инфузиягача.

Операциядан кейинги даврда ва турии хирургик аракалашувлардан кейин – 400 мл дозада (тана вазнига 6-7 мл/кг) томчилаб, бир марта ёки тақорий, хар куни, 3-5 кун давомида юборилади.

Ўтқар қон ўйқотилишида – 1500-1800 мл дан (тана вазнига 25 мл/кг гача) юборилади. Бундай холда Велодепнинг инфузиясини маҳсус ёрдам машинасида, касалхонага ёткизишга бўлгичча ўтказиш тавсия этилади.

Травматик, кўйини, операциядан кейинги ва гемолитик шокда – 600-1000 мл дан (тана вазнига 10-15 мл/кг) бир марта ва тақорий, оқим оқим сунгра сўнгина томчилаб юборилади.

6 ёнгача бўлган болаларга препаратни тана вазнига 10 мл/кг доза хисобидан юбориш тавсия этилади, 6 дан 12 ёнгача болаларга – катталар учун дозанинг ярмини ташкил килувчи дозада юборилади. 12 ёнгача катталарга болаларга – катталардаги каби дозада юборилади.

Ною́ж таъсири

Алкалоз кўринишлари, аллергик реакциялар (терида тошмалар, кичинчиш) пайдо бўлиши мумкин.

Қўллануусун мумкин бўлмаган холатлар

- алкалоз;
- катта хажмадиги суюкликларни кўйиш мумкин бўлмаган холатлар (минига кон кўилиши, тромбозмий, иорак-томир деконексияси, III даражали артериал гипертензия);
- препаратнинг компонентларни юкори сезуччанинда кўлаш мумкин эмас.

Жигар функциясининг бузилиши, меъда-ичак яра касаллиги, геморрой колити бўлган беморларга препаратни эхтиёткорлик билан буюртаскеради.

Жигар функциясининг бузилишилари кўллаш

Жигар функциясининг бузилиши билан беморларга препаратни эхтиёткорлик билан кўлаш керак.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Велодепнинг фосфат - ва карбонатларни сакловчи эртималар билан арапалшириш мумкин эмас.

Бошқа дори препаратлари учун ташувчи-эртима сифатида кўллаш мумкин эмас.

Максус кўрсатмалар

Препаратни кислота-ишик холатнинг ва коннинг электролитлари, шунингдек жигарнинг функционал холатнинг кўрсаттичларини назорати остида кўлланади.

Калъкузез холецинтизмидни бўлган беморларда эхтиёткорлик билан кўлланади.

Хомиладорлик ва лактация даврида кўлланилиши

Велодеп препаратини хомиладорлик ва эмизиш даврида кўллаш бўйича маънумотлар мавжуд эмас.

Болаларда кўлланниш

6 ёнгача бўлган болаларга препаратни тана вазнига 10 мл/кг доза хисобидан юбориш тавсия этилади; 6 дан 12 ёнгача болаларга – катталар учун дозанинг ярмини ташкил килувчи дозада юборилади. 12 ёнгача ошган болалар – катталардаги каби дозада юборилади.

Дозани ошириб юборилниш

Симптомлари: алкалоз кўринишлари пайдо бўлади, улар препаратни юбориш дарҳол тўхтатилган шаронтида тез мустакил ўтнб кетади.

Чиқарлиши шакли

200 мл инфузия учун эртима USP II турдаги тиник флаконда, резина копокки.

1 флакон давлат ва рус тилларда тиббиётда кўлланилишига доир ўтируномаси билан бирга картон ўрэмга жойлаштирилади.

Сакланыш шарнити

25°C дан юкори бўлмаган хароратда курук, ёрғулидан химояланган жойда сакланиси.

Болалар олоп-майдандиган жойда сакланиси.

Музлатилмасин.

Яркоқилик муддати

3 йил.

Яркоқилик муддати ўттач ишлатилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецепт бўйича.

Савдо маркази ва рўйхатдан ўтказилганлик гувохномаси эгаси Vegapharm Life Sciences Pvt. Ltd., Хиндистон

Ишлаб чиқарувчи

Aishwarya Healthcare

Vill. Thana, Baddi,

Nalagarh, Distt. Solan (H.P), Хиндистон



Vegapharm

Ўзбекистон Республикаси худудида ракамли маркировка тизими бўйича масуль бўлган, шунингдек, дори воситаларининг сифати бўйича ётирилор (таскиллар) ни кабул килувчи ташкил номи ва манзили:

«Ameliya Pharm Service» МЧЖ,

100185, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Серкуёш 3.

Тел.: +998 78 150 50 81, +99878 150 5082

E-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk